

Brainal[®] comprimidos

nimodipino



COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Nimodipino (D.C.I.)30 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, almidón de maíz, povidona, crospovidona, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol, dióxido de titanio.

PROPIEDADES

Nimodipino está, especialmente dotado de un efecto antivasoconstrictor y antiisquémico cerebral, pudiendo prevenir o eliminar vasoconstricciones inducidas por diversas sustancias vasoactivas (histamina, serotonina, prostaglandina) y por sangre o productos de su degradación.

Nimodipino dilata los vasos cerebrales y aumenta la circulación cerebral, según se ha constatado en investigaciones realizadas en pacientes con alteraciones circulatorias cerebrales agudas: el incremento de la perfusión es generalmente más pronunciado en áreas del cerebro con daño previo y circulación restringida que en las áreas cerebrales sanas. La mejoría es particularmente notable en pacientes con vasoespasmos cerebrales como consecuencia de una hemorragia subaracnoidea.

Además, Nimodipino provoca una reducción significativa del déficit neurológico isquémico causado por vasoespasmos, así como de la mortalidad.

INDICACIONES

Prevención del deterioro neurológico ocasionado por vasoespasmo cerebral secundario a hemorragia subaracnoidea.

Ensayos clínicos controlados han evidenciado mejoría de los síntomas de deterioro mental relacionados con la edad, tales como trastornos cognitivos, labilidad emocional y falta de iniciativa. Antes de iniciar el tratamiento con Nimodipino debe descartarse la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades subyacentes que den origen a estos síntomas.

POSOLOGIA

En pacientes afectados de ictus isquémico se recomienda iniciar el tratamiento con dosis de 1 comprimido de BRAINAL[®] 4 veces al día (cada seis horas). No existe evidencia de la utilidad de prolongar el tratamiento más allá de un mes.

En la prevención de deficiencias neurológicas isquémicas a consecuencia de vasoespasmos cerebrales tras una hemorragia subaracnoidea debería emplearse (después de una infusión previa de BRAINAL[®] solución durante 5 a 14 días) una dosis diaria de 2 comprimidos de BRAINAL[®] 6 veces al día (6 veces 60 mg), por espacio de 7 días.

El intervalo entre las administraciones correspondientes no debería ser inferior a 4 horas.

Los comprimidos se ingieren generalmente sin masticar y con un poco de líquido, independientemente de las comidas.

En caso de insuficiencia renal o hepática severa especialmente la cirrosis hepática, la acción y efectos secundarios de Nimodipino pueden ser más pronunciados; por ejemplo la reducción de la presión sanguínea. En estos casos la dosis debe reducirse en concordancia con la presión sanguínea y el E.C.G.

CONTRAINDICACIONES

Nimodipino debe utilizarse con precaución en casos de edema cerebral generalizado y en la hipertensión intracraneal grave.

Siguiendo las normas generales de empleo de medicamentos durante el embarazo, la indicación de Nimodipino sólo podrá establecerse con un criterio muy riguroso.

INTERACCIONES

En pacientes hipertensos que reciben medicación antihipertensiva, el uso concomitante de Nimodipino puede potenciar el efecto hipotensor.

Debe evitarse la administración intravenosa simultánea de Beta-bloqueadores puesto que puede inducir una marcada reducción de la presión sanguínea.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Pueden presentarse los siguientes: dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, náuseas, rubefacción facial (flush), sensación de calor y descenso de la presión sanguínea, particularmente cuando el valor inicial es elevado.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se ha descrito. Sin embargo, en caso de sobredosificación deberá establecerse el tratamiento sintomático oportuno.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACION

Envases con 30 y 100 comprimidos.

IMPORTANTE

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CON RECETA MEDICA

Fabricado por Laboratorios Medicamentos Internacionales, S.A.

Laboratorios Andrómaco, S.A.
Doctor Zamenhof, 36 – 28027 Madrid

